



## التسمم الدوائي

التسمم الدوائي يحدث بسبب استهلاك كمية زائدة من دواء معين بقصد أو بغير قصد ، ومن الممكن أن يحدث من خلال التداخل الدوائي بين عدد من الأدوية أو بين أحد الأدوية ونوع معين من الأطعمة مما يسبب أضراراً على الجسد قد تصل في بعض الحالات إلى الموت.

### الإسعافات الأولية في حالات التسمم الدوائي:

أولاً : يجب الاتصال مع مركز طوارئ الدفاع المدني القريب منك واتباع التعليمات التي يتم إعطائها لحين وصول سيارة الإسعاف .

ثانياً: الاحتفاظ بالدواء المتوقع تسببه لتسمم الدوائي وإعطائها للطبيب المعالج عند الوصول لمركز الطوارئ.

ثالثاً: التأكد من وضع المصاب في منطقة ذات تهوية جيدة وأنه يتنفس بشكل طبيعي لحين وصول سيارة الإسعاف.



## كيفية التعامل مع التسمم الدوائي

مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة





### التسمم الدوائي عند الأطفال:

يشكل الأطفال النسبة الأكبر من المصابين بالتسمم الدوائي عن طريق الخطأ خصوصاً من هم دون الخمسة سنوات من العمر بسبب:

- تناولهم لبعض الأدوية التي تشبه الحلوى .
- ضعف أجسامهم وعدم قدرتها على تحمل بعض الأدوية القوية كالتي توصف لمرضى الاضطرابات العقلية.

لذلك يجب على الأهل عدم وضع الأدوية في متناول الأطفال..

*“Don’t be shy! Show them how fabulous you are! This is a great spot for a glowing testimonial.”*

### مسببات للتسمم الدوائي:

- عدم حفظ الدواء في مكان سليم وآمن.
- عدم حفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.
- غياب الرقابة والاهتمام الأسري.
- الاستعمال الخاطئ للدواء.
- الإقبال على الانتحار بتناول كميات كبيرة من الأدوية.
- تناول الدواء دون مشورة الطبيب او الصيدلي



الأعراض التي يمكن من خلالها التعرف على حالات التسمم الدوائي:

- ضيق التنفس، وقد يصل الأمر لحد توقف النفس والشعور بالاختناق.
- الشعور بالغثيان، والقيء.
- انخفاض ضغط الدم.
- انخفاض درجة حرارة الجسم، والشعور بالبرودة الشديدة.
- التعرق الشديد، والهلوسة في بعض الأحيان.
- حدوث بعض التشنجات العضلية، والرعشة.
- تسارع ضربات القلب بشكل ملحوظ.
- الشعور بالنعاس الشديد، وكثرة النوم.
- الشعور بالدوار، وقد يصل الأمر للإغماء.
- اختلال الرؤية.