

المقدمة :

اعتبر التدخين من أشد الوبية فتكاً بصحة الفرد والمجتمع، لما له من اخطار جسيمة على الصحة. ولا تقتصر مضار التدخين على المدخن نفسه بل تتعداه للآخرين، وقد ثبت أن مخاطر التدخين اللا رادي على غير المدخن لا تقل سوءاً منها على المدخن نفسه.

مضار التدخين الصحية :

التدخين والقلب:

بيّنت الدراسات أن للتدخين علاقة وثيقة أساسية بمرض تصلب الشرايين إذ أنه يؤدي إلى:

١ - انخفاض نسبة البروتينات الدهنية عالية الكثافة المسؤولة عن حماية الشرايين من التصلب، كما يساعد على ازدياد نسبة البروتينات قليلة الكثافة المؤدية إلى تصلب الشرايين.

٢ - عدم انتظام ضربات القلب وهذا يؤدي إلى حدوث الموت المفاجئ في حالة الجلطة.

٣ - تقليل كمية الاكسجين التي تصل إلى انسجة الجسم، وهذا يؤدي إلى ازدياد الضغط على عضلة القلب.

٤ - ازدياد الصفائح الدموية في الدم وبالتالي يرفع احتمالات حدوث الجلطة.

٥ - تشنج في الشرايين.

٦ - التأثير النافذ للاردة المستعمرة في علاج

التدخين والجهاز التنفسى:

يتسبب التدخين في ٩٠% - ٧٥% من امراض التنفس بسبب تأثير الدخان المباشر على هذا الجهاز لأن مادة الامونيا التي يحتويها الدخان تسبب التهاب الاغشية المخاطية في الانف والفم والقصبات الهوائية وهذا يسبب السعال للمدخنين كما يحدث ضيق في التنفس، بسبب الذرات الكربونية الموجودة في الدخان.

بيّنت الدراسات أن ٨٠% من المدخنين يعانون من التهاب القصبات الهوائية، إضافة إلى انتفاخ الرئة والسل وسرطان الرئة.

تأثير التدخين على الام الحامل والجنين:

يؤثر التدخين على الام الحامل والجنين بشكل سلبي فهو:-

- يؤدي إلى زيادة حدوث الامراض نتيجة انتقال المواد السمية الموجودة في الدخان للجنين عن طريق المشيمية.

- يزيد من احتمالات الاجهاض بنسبة ٢١٪ مقارنة مع الامهات غير المدخنات.

- يؤدي إلى زيادة حدوث مضاعفات الحمل كالنزف وانزلاق المشيمية والولادة المبكرة.

- يقل وزن الطفل عند الولادة بمعدل ٢٠٠ غ عن الوزن الطبيعي.

٢ - يعاني العديد من غير المدخنين من دخان زملائهم وأقربائهم خاصة من الأماكن المغلقة لأن غير المدخنين في الأماكن العامة مثل دور السينما، وقاعات الاحتفال والاجتماعات.. الخ يتعرضون مباشرة إلى الدخان الضار بصحتهم.

٤ - أظهرت دراسات متعددة وجود نسبة عالية من مادة النيكوتين وأول أكسيد الكربون ومواد سمية أخرى في دم المخالطين للمدخنين نتيجة تعرضهم لاستنشاق دخان غيرهم.

٥ - يؤدي التعرض لفترات طويلة لاستنشاق دخان الآخرين إلى الإصابة بالأمراض التالية.

٦ - تحرير حكة والتهابات في ملتحمة العين والأنف والبلعوم.

٧ - التهاب القصبات والحساسية وانتفاخ الرئة.

٨ - أطفال المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الرئوي بنسبة الضعف.

٩ - المصابون المزمنون للمدخنين أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة.

١٠ - زوجات المدخنين أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة بنسبة ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، مقارنة مع زوجات غير المدخنين.

١١ - زوجة المدخن الحامل تتعرض إلى الإجهاض

ـ تزيد احتمالات وفاة الطفل عند الولادة أو خلال الشهر الأول بحيث تزيد بنسبة ٢٥٪ - ٢٠٪ ويرتبط ذلك بعدد السجائر التي تدخنتها الأم.

ـ يؤثر التدخين على قدرة المرأة على الانجاب فالمرأة المدخنة أكثر عرضة للإصابة بالعقم بنسبة ٢٪ : ١٪ مقارنة بغير المدخنين.

ـ ينقطع الطمث لدى المرأة المدخنة بوقت أبكر بمعدل ٢ - ٣ سنوات مقارنة مع غير المدخنة.

ـ النساء المدخنات اللواتي يستعملن حبوب منع الحمل تزيد لديهن نسبة الإصابة بأمراض القلب الشريانية والكتلة الدماغية بنسبة ١٠ - ٢٠٪ ضعفاً.

التدخين القسري (اللارادي):

يحدث التدخين اللارادي عندما يتعرض غير المدخن لدخان التبغ المحترق في الأماكن المغلقة (أي استنشاق غير المدخن لدخان الآخرين) ان الهواء الملوث بالتدخين يأتي من مصدرين:

١ - الدخان المباشر، وينبع من طرف السيجارة المشتعلة إلى البيئة.

٢ - الدخان غير المباشر وهو عبارة عن جملة الدخان المتطاير الذي يستنشقه المدخن ثم يخرجه من الزفير.

تأثير التدخين على جمال المرأة :

- ١ - يؤثر التدخين على جمال المرأة وجاذبيتها فالملاواد السومه في الدخان تسبب ترهلاً وتغيراً في لون بشرة المدخن وتجعلها مائلة للاصفرار وربما التشقق.
- ٢ - يغير الدخان لون شعر المدخنة، فيجعل لونه باهتاً لا حيوية فيه، بما في ذلك الاهداب والحواجب.
- ٣ - تشكل عيون المرأة أهم عامل لجمالها، لكن ماذا يحدث لو وجدت امرأة في مجتمع مدخن، نلاحظ ان عينيها قد اصبتا بالاحمرار والادماع الشديدين مما يسبب التخرش.
- ٤ - يتمتع غير المدخنين بلياقة وقابلية بدنية أعلى من المدخنين من العمر والبيئة نفسها، نظر لتأثيرات التدخين السلبية على وظائف الرئتين والقلب والشرايين وبقية أعضاء الجسم، فنجد المدخنين غير قادرين على مجاراة من يماثلهم في العمر والبنية في العمل البدني والرياضة والتدريب وتسلق السلاالم والمشي لمسافات طويلة كما اثبتت دراسات أخرى ان سبب نقص اللياقة والقابلية البدنية عند المدخنين يعود الى تأثير وظائف الرئة بشكل يقل معه الاحتياطي بحيث لا تستطيع تحمل الجهد الاضافي كما ان ضربات القلب عند المدخنين أسرع بنسبة ٢٤٪ منها بين غير

الاضرار الاقتصادية لوباء التدخين :

- ١ - انخفاض انتاجية الفرد من حيث كثرة اصابته بالأمراض، وقلة القدرة على التركيز.
- ٢ - زيادة نسبة الوفيات المبكرة بين الاطفال حديثي الولادة.
- ٣ - زيادة نسبة وفيات المدخنين نتيجة اصابتهم بالأمراض الخطيرة.
- ٤ - الغياب عن العمل نتيجة المرض.
- ٥ - نقص الكفاءة للانشغال بالتدخين.
- ٦ - زيادة تكلفة العناية الطبية نتيجة لامراض التي يسببها التدخين.
- ٧ - الخسائر الناجمة عن الحوادث والحرائق.
- ٨ - بيّنت الدراسات ان ما يزيد على ٢٠ مليون دينار سنوياً تكاليف تنظيف الاماكن العامة وادوات التدخين (المتنفسة وكتب المدخن والكرسي والارض، والملابس، والاجهزة الحساسة في المكتب، اضافة الى المبالغ التي تصرف لعلاج المدخن).

قدرت تكاليف الاضرار الناجمة عن التدخين بالملايين وذلك بدل ايام تعفي المرضى عن العمل سنوياً نتيجة المرض ومبالغاً كبيرة الى تكاليف الرعاية الصحية لمعالجة المرض نتيجة التدخين.

معلومات عامة عن التدخين :

يقدر عدد الذين اقلعوا عن التدخين نتيجة برامـــج الاعلام والتثقيف الصحي بخمسة ملايين وستمائة الف شخص في كندا وعشرة ملايين شخص في بريطانيا، واربعين مليون في الولايات المتحدة في حين يموت مليونان ونصف مليون شخص في سن مبكرة في كل سنه في العالم بسبب الامراض التي يسببها التبغ.

الانسان لا يدرك هذا الخطر ولا يهتم به لأن مضاعفات التدخين وأثاره السيئة لا تظهر الا بعد فترة طويلة نسبياً في بدء التدخين من (٥ - ٢٠) سنة.



التحقيق الصحي - مديرية الرعاية
الصحية الاولية
وزارة الصحة

بالتعاون مع مديرية الامن العام
تلفون ٦٨٨١٧٢ - ص. ب
عمان - الاردن